

Enrico Ratti

**COLEOPTERA LYCTIDAE E BOSTRICHIDAE INTERCETTATI  
NEL PORTO E NEGLI AMBIENTI URBANI DI VENEZIA**

**Riassunto.** Sono elencate le specie (sia alloctone che indigene) di Lyctidae e Bostrichidae intercettate nel porto e nella città di Venezia. Prime segnalazioni – Europa: *Dinoderus porcellus* Lesne, 1923 (Bostrichidae); Italia: *Minthea obsita* Wollaston, 1867 (Lyctidae), *Sinoxylon sudanicum* Lesne, 1895, *Xyloperthodes nitidipennis* (Murray, 1867), *Xyloperthella crinitarsis* (Imhoff, 1843), *Xylion adustus* Fahraeus, 1871 (Bostrichidae). Solo *Scobicia chevrieri* (A. Villa & G.B.Villa, 1937) e *Trogoxylon impressum* (Comolli, 1837) sembrano presenti con popolazioni stabili.

**Summary.** *Coleoptera Lyctidae and Bostrichidae intercepted at port and in urban environments of Venice [Italy].* A list of both exotic and domestic species of Lyctidae and Bostrichidae intercepted at Venice port and in Venice urban environments is given. First records – Europe: *Dinoderus porcellus* Lesne, 1923 (Bostrichidae); Italy: *Minthea obsita* Wollaston, 1867 (Lyctidae), *Sinoxylon sudanicum* Lesne, 1895, *Xyloperthodes nitidipennis* (Murray, 1867), *Xyloperthella crinitarsis* (Imhoff, 1843), *Xylion adustus* Fahraeus, 1871 (Bostrichidae). Only *Scobicia chevrieri* (A. Villa & G.B.Villa, 1937) and *Trogoxylon impressum* (Comolli, 1837) possibly show stable populations in the area.

Nell'elenco seguente sono riportate 18 specie (Lyctidae, 4; Bostrichidae, 14), in particolare: 14 specie alloctone, intercettate su vegetali o prodotti vegetali d'importazione; 3 specie acclimatate in ambienti antropici urbani (*Trogoxylon*, *Lyctus*, *Rhyzopertha*); 1 specie autoctona, legata ad essenze arboree presenti nell'area veneziana (*Scobicia*).

Il materiale è conservato nelle collezioni del Museo civico di Storia Naturale di Venezia. Sono grato al dr. K.-U. Geis per la revisione di alcune mie determinazioni e per l'identificazione di alcune altre specie.

LYCTIDAE

**Trogoxylon impressum** (Comolli, 1837)

Venezia città, 7.VII.1951, 1 es., leg. Bognolo, det. E. Ratti; 15.VI.1961, 2 es., leg. L. Bonometto, det. E. Ratti. Venezia, Mestre, 18.V.1964, 1 es., leg. G. Marcuzzo, det. E. Ratti.

Palaartico sud-occidentale, diffuso in Turkestan (HORION, 1961), Iran, Russia meridionale, Mar Nero, Mediterraneo ed Europa meridionale sino alla Germania meridionale; tutta Italia e isole (NARDI & RATTI, 1995). Introdotto in Europa centro-settentrionale e nelle Americhe. A Venezia esclusivamente sinantropo e verosimilmente importato con legname. Polixilofago, segnalato nel legno di numerose piante (GAMBETTA & ORLANDI, 1982; NARDI & RATTI, 1995).

**Lyctus brunneus** (Stephens, 1830)

Venezia porto, da legname importato, II.1972, 4 es., leg. L. Rampini, det. K.-U. Geis, 2002. Venezia città, in abitazione [da pavimento a parchetti], 20.V.1967, 1 es., IX.1968, 16 es., leg. E. Ratti, det. E. Ratti, 1970.

Cosmopolita in regioni tropicali e subtropicali. Introdotto in quasi tutta Europa; in Italia sinantropo (BURLINI, 1972; CAVALLORO & RATTI, 1978; GAMBETTA & ORLANDI,

1982; GAMBETTA, 1983). Polixilofago: attacca legni di latifolia (sia indigeni che esotici) con adeguato contenuto in amido (GAMBETTA & ORLANDI, 1982).

**Minthea obsita** Wollaston, 1867

Venezia porto, X.1999, su legname importato dal Cameroon, 5 es., leg. M. Vettorazzo, det. E. Ratti, 1999, vidit K.-U. Geis, 2002.

Afrotropicale. In Europa una sola, antica segnalazione per l'Austria (HORION, 1961). *Prima segnalazione per l'Italia.*

**Lyctoxylon dentatum** (Pascoe, 1866)

Venezia porto, V.1969, in rizomi di manioca importati dallo Zambia, 1 es., leg. L. Rampini, det. D.G.H. Halstead, 1971 (RATTI & RAMPINI, 1977).

Subcosmopolita d'origine orientale. Introdotto occasionalmente in Europa: Gran Bretagna, 1934 (GERBERG, 1957); Germania, vari reperti tra 1977 e 1997 (GEIS, 1995; SCHLIESSKE, 1998; GEIS, 2002), forse avventizio (GEIS, 2000). Olanda (BRAKMAN, 1966). Il presente è l'unico reperto italiano. Attacca bambù e legni esotici.

**BOSTRICHIDAE**

**Rhyzopertha dominica** (Fabricius, 1792)

Venezia porto, V.1969, in rizomi di manioca importati dal Sudafrica, 12 es., leg. E. Ratti, det. D.G.H. Halstead, 1971; II.1970, leg. E. Ratti, det. E. Ratti, 1972. Pochi reperti occasionali anche a Venezia città, nelle abitazioni (teste Ratti).

Cosmopolita di probabile origine orientale, parassita primario soprattutto di cereali e derivati. Segnalato in quasi tutta Europa e in tutta Italia, grandi isole comprese; normalmente sinantropo.

**Dinoderus minutus** (Fabricius, 1775)

Venezia porto, II.1971, in rizomi di manioca importati dal Sudafrica, 2 es., leg. E. Ratti, det. K.-U. Geis, 2002 (RATTI & RAMPINI, 1977, sub *Dinoderus* sp., partim).

Cosmopolita d'origine tropicale, legato ai bambù ed alle sostanze amilacee. Frequentemente intercettato in Europa ed in Italia ma esclusivamente sinantropo e non acclimatato.

**Dinoderus porcellus** Lesne, 1923

Venezia porto, II.1969, in rizomi di manioca importati dallo Zambia, 3 es., leg. L. Rampini, det. K.-U. Geis, 2002 (RATTI & RAMPINI, 1977, sub *Dinoderus* sp., partim).

Afrotropicale, descritto dell'Africa occidentale. *Prima segnalazione per l'Europa.*

**Bostrichus capucinus** (Linné, 1758)

Venezia città, VI.1959, 4 es., leg. C. Sopracordevole, det. E. Ratti.

Palaartico, diffuso dall'Europa e dal bacino del Mediterraneo sino a Cina e Siberia (NARDI & RATTI, 1995); indicato di tutta Italia e isole, ma non autoctono nel veneziano. Polixilofago, necessita di un periodo freddo invernale per completare il ciclo (CYMOREK, 1970). Esemplari probabilmente sfarfallati da un deposito di legname.

**Heterobostrychus aequalis** (Waterhouse, 1884)

Venezia porto, XI.1998, su liste di “ramino” importate dalla Malaysia, 1 es., leg. M. Vettorazzo, det. E. Ratti, 1998, vidit K.-U. Geis, 2002 (RATTI, 2002a).

Orientale (SE Asia, Nuova Guinea, Madagascar, Comore). Polixilofago, raccolto anche su manioca. Occasionalmente introdotto in Europa: Gran Bretagna, più volte da W-Africa (LEPESME, 1944), dalla Thailandia con legno di *Anisoptera* (BAKER & BERRY, 1978); Germania: 1902, 1937 (HORION, 1961), altri cinque reperti su legno e manioca dall’Indomalesia (CYMOREK, 1970), 1995-1999, pochi reperti (GEIS, 2002); Olanda (BRAKMAN, 1966). In Italia intercettato raramente, su legname importato dall’Asia e su legno di *Hevea brasiliensis* (GAMBETTA, 1983).

**Heterobostrychus brunneus** (Murray, 1867)

Venezia porto, X.1999, importati con legname dal Cameroon, 2 es., leg. E. Ratti, det. E. Ratti, 1999, vidit. K.-U. Geis, 2002; IX.2000, 2 es., leg. M. Vettorazzo, det. E. Ratti, 2000 (RATTI, 2002b).

Afrotropicale. Introdotto con legname africano in Europa: Belgio (VRYDAGH, 1958); Gran Bretagna, con legno Abachi dal Ghana (BAKER & BERRY, 1978); Francia, 1969 (CYMOREK, 1970); Germania, due vecchie segnalazioni (HORION, 1961), 1950 (KOHLER & KLAUSNITZER, 1998), 1964, in legno di tek dal Congo, poi 4 reperti tra 1964 e 1969 (CYMOREK, 1970), poche segnalazioni recenti (GEIS, 2002); Spagna, 1963 (ESPANOL, 1972).

In Italia pochi reperti, per lo più da depositi di legname esotico (GAMBETTA & ORLANDI, 1982; GAMBETTA, 1983; AUDISIO et al., 1995; CHIAPPINI et al., 2001).

**Bostrychoplites cornutus** (Olivier, 1790)

Venezia porto, V.1969, in rizomi di manioca importati dal Sudafrica, 1 es., leg. E. Ratti, det. D.G.H. Halstead, 1971 (RATTI & RAMPINI, 1977).

Afrotropicale. Occasionalmente introdotto con il legname in Europa (Svezia, Danimarca, Germania, Austria, Spagna) e in Italia (GAMBETTA & ORLANDI, 1982; GAMBETTA, 1983; AUDISIO et al., 1995).

**Sinoxylon conigerum** Gerstäcker, 1855

Venezia porto, V.1969, in rizomi di manioca importati dal Sudafrica, 1 es., leg. E. Ratti, det. K.-U. Geis, 2002 (RATTI & RAMPINI, 1977, sub *Sinoxylon* sp., partim).

Cosmopolita pantropicale, polixilofago. Introdotto con legname o manioca in Europa (Gran Bretagna, Germania, Ucraina) e, in una sola altra occasione, in Italia (POGGI et al., 1994).

**Sinoxylon sudanicum** Lesne, 1895

Venezia porto, IX.1970, 1 es., leg. L. Rampini, det. K.-U. Geis, 2002.

Regione orientale e afrotropicale orientale. Introdotto una sola volta in Europa: Germania, Amburgo, 1996 in legno d’imballaggio dall’India (GEIS, 2000). *Prima segnalazione per l’Italia.*

**Sinoxylon** sp. (? **angolense** Lesne, 1907)

Venezia porto, V.1969, in rizomi di manioca importati dal Sudafrica, 1 es., leg. E. Ratti, det. K.-U. Geis, 2002 (RATTI & RAMPINI, 1977, sub *Sinoxylon* sp., partim).

Afrotropicale. Determinazione incerta, esemplare privo di antenne. Se confermata, sarebbe la prima segnalazione per l'Europa.

**Scobicia chevrieri** (A. Villa et G.B. Villa, 1835)

Venezia città, VI.1954, 1 es. leg. R. Zecchini, det. E. Ratti; 4.V.1968, 1 es. leg. L. Bonometto, det. E. Ratti. Venezia Mestre, 9.VI.1988, 1 es., leg. L. Bertoli, det. E. Ratti.

Mediterraneo, a E sino all'Ungheria, al Mar Caspio e all'Iran. Segnalato di tutta Italia e isole (NARDI & RATTI, 1995). Specie autoctona a Venezia, dove vive probabilmente a spese di *Ficus carica* (forse anche di *Laurus nobilis*).

**Xyloperthodes nitidipennis** (Murray, 1867)

Venezia porto, X.1999, in legname dal Cameroon, 2 es., leg. M. Vettorazzo, det. E. Ratti, 1999, vidit K.-U. Geis, 2002; IX.2000, 2 es., leg. M. Vettorazzo, det. K.-U. Geis, 2002.

Afrotropicale. Occasionalmente introdotto in Europa con legno di "abachi" dall'Africa occidentale (Gran Bretagna: BAKER & BERRY, 1978; Germania: GEIS, 2002). *Prima segnalazione per l'Italia.*

**Xyloperthella crinitarsis** (Imhoff, 1843)

Venezia Mestre, 14.I.1984, in una segheria su legno di mogano, 1 es., leg. L. Bertoli, det. E. Ratti, 1999, vidit K.-U. Geis, 2002.

Afrotropicale (limitato all'Africa occidentale). Introdotto occasionalmente in Europa con legname africano (Gran Bretagna, Olanda, Germania, Francia). *Prima segnalazione per l'Italia.*

**Xylion adustus** Fahraeus, 1871

Venezia porto, V.1969, in rizomi di manioca importati dal Sudafrica, 1 es., leg. E. Ratti, det. E. Ratti, 1999, vidit K.-U. Geis, 2002 (RATTI & RAMPINI, 1977, sub *Xylion* sp.).

Afrotropicale. Introdotto in una sola occasione in Europa (Gran Bretagna) con legno di *Erytrophleum* dalla Tanzania (BAKER & BERRY, 1978). *Prima segnalazione per l'Italia.*

**Bibliografia**

- AUDISIO P., GOBBI G., LIBERTI G., NARDI G., 1995 - Coleoptera Polyphaga IX (Bostrichoidea, Cleroidea, Lymexyloidea) In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 53. *Calderini*, Bologna.
- BAKER J.M., BERRY R.W., 1978 - Exotic timber insect species intercepted in the U.K. since 1945. *Intern. Res. Group on Wood Preserv. IRG/WP Doc.* 182, 1-5 .
- BRAKMAN P.J., 1966 - Korte coleopterologische Notities VII. *Ent. Berich. (Amsterdam)* 26: 43-53.
- BURLINI M., 1972 - Una infestazione di *Lyctus brunneus* Steph. sui pavimenti a parchetti. *Boll. Soc. Entomol. ital.* 104 (8): 176.
- CAVALLORO R., RATTI E., 1978 - Una infestazione da *Lyctus brunneus* (Steph.) e *Bostrychus capucinus* (L.) su radica di erica (*Erica arborea* L.). *Boll. Soc. entomol. ital.* 110 (4-6): 69-71.
- CHIAPPINI E., LIOTTA G., REGUZZI M.C., BATTISTI A., 2001 - Insetti e restauro. *Edagricole*, Bologna: 1-260.

- CYMOREK S., 1970 - Eingeschleppte und einheimische Bohr- und Splintholzkafer als Holzschadlinge (Col.; Bostrychidae, Lyctidae): Übersicht zur Lebensweise, über Vorkommen, Einschleppungen, wirtschaftliche Bedeutung, Bekämpfung. *Zeits. Angew. Entomol.* 66 (2): 206-224.
- ESPAÑOL F., 1972 - Nuevos datos sobre los Bostrychidae de la fauna Española (Col. Cucujoidea). *Graellsia* 28: 37-44.
- GAMBETTA A. 1983 - List of insects intercepted in imported timbers in Italy. *Intern. Res. Group on Wood Preserv. IRG/WP Doc.* 1217: 1-3.
- GAMBETTA A., ORLANDI E., 1982 - Su alcuni insetti reperiti nel legname nei depositi - I° Lictidi e Bostrichidi. *Contrib. Scient.-prat. per una migliore conoscenza ed utilizzazione del legno* 30 (n° 77): 1-28.
- GEIS K.-U., 1995 - Ein ostasiatischer Bambus-Splintholzkafer, *Lyctoxylon dentatum* (Pascoe), zweimal eingeschleppt nach Südwest-Mitteleuropa (Coleoptera, Lyctidae). *Mitt. Ent. Ver. Stuttgart* 30: 16-18.
- GEIS K.-U., 2000 - Timber infesting species of Col. Lyctidae and Bostrichidae imported into Germany since ca. 1985. *Intern. Res. Group on Wood Preserv., Rep. of Sect. 1* 2000, IRG/WP 00-10385, 7 pp.
- GEIS K.-U., 2002 - Gebietsfremde Splintholz- und Bohrkäfer, nach Mitteleuropa mit Importholz und anderen Gütern eingeschleppt. - Eine Bestandsaufnahme. (Coleoptera: Lyctidae, Bostrichidae). *Mitt. Ent. Ver. Frankfurt/M. Suppl.* X: (in press).
- GERBERG E.J., 1957 - A revision of the New World species of powder-post beetles belonging to the family Lyctidae. *U.S. Dept. Agr., Tech. Bull.* 1157: 1-55.
- HORION H., 1961 - Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VIII. Überlingen – Bodensee, XV+375 pp.
- KOHLER F., KLAUSNITZER B. (eds.), 1998 - Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entomofauna Germanica. *Entomol. Nachr. U. Ber.* (Dresden) 4: 1-185.
- LEPESME P., 1944 - Les Coléoptères des denrées alimentaires et des produits industriels entreposés. *Encycl. Entomol. A 21, Lechevalier*, Paris: 1-335.
- NARDI G., RATTI E., 1995 - Coleoptera Lyctidae, Bostrychidae e Anobidae di Pantelleria e Lampedusa. *Naturalista sicil.* 19 (Suppl.): 477-492.
- POGGI R., BRUSSINO G., SCARPELLI F., 1994 - Intercettazione in Piemonte di *Sinoxylon conigerum* Gerstaecker (Coleoptera: Bostrichidae). *Atti XVII Congr. naz. ital. Entomol.*, Udine 13-18 giugno 1994: 217-219.
- RATTI E., 2002a - Segnalazioni 72 - *Heterobotrychus aequalis*. *Boll. Mus. civ. Stor. Nat. Venezia* 53: 282-283.
- RATTI E., 2002b - Segnalazioni 73 - *Heterobotrychus brunneus*. *Boll. Mus. civ. Stor. Nat. Venezia* 53: 283.
- RATTI E., RAMPINI L., 1977 - Risultati di alcuni controlli fitosanitari nel porto di Venezia. 1 - La coleotterofauna associata ai rizomi di manioca importati dall'Africa meridionale (Coleoptera). *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.* 2: 30-34.
- SCHLIESSKE J., 1998 - Zur Einschleppung von Insekten durch moderne Transportfazilitäten im Seegütervercher. *Verh. Westd. Entom. Tag* 1997: 57-65 (1998).
- VRYDAGH J.M., 1958 - Presence en Belgique d'un Lyctide exotique: *Trogoxylon aequale* Woll. *Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg.* 97: 37-39.

*Indirizzo dell'Autore:*

Dr. Enrico Ratti,  
 Museo civico di Storia Naturale, S. Croce 1730, I – 30135 Venezia (Italia)  
 E-mail: enrico.ratti@comune.venezia.it