

ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI

(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO
ANNO 2008

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2008 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la prima riproduzione portata a termine in Veneto di Fenicottero; la comparsa di alcune specie di presenza sporadica quali Aquila anatraia minore, Falaropo beccosottile, Gabbiano corso, Picchio rosso minore, Rondine rossiccia, Calandro maggiore, Ballerina nera, Usignolo maggiore, Zigolo golarossa e la prima segnalazione nota di Gracchio corallino per l'arco alpino orientale degli ultimi 50 anni; inoltre, la prima segnalazione italiana in ambiente fluviale urbano di Fenicottero.

Summary. *Ornithological report for the year 2008 in the Veneto region (NE Italy).* Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of breeding Greater Flamingo and the observations of Greater Spotted Eagle, Red-necked Phalarope, Audouin's Gull, Lesser Spotted Woodpecker, Red-Rumped Swallow, Richard's Pipit, Black Wagtail, Thrush Nightingale, Red-billed Chough and Pine Bunting.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2008 relative a 136 specie di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO *et al.*, 2009) e 8 specie alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3] Venezia BW; [4] Menacò Brescia; [5] BW-Italia. Con "censimenti IW" si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.

L'elenco sistematico è aggiornato all'ultima check list CISO-COI degli uccelli italiani (FRACASSO *et al.*, 2009). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a VIOLANI & BARBAGLI (2006) e MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

*Anseriformes**Anseridae***Cigno reale *Cygnus olor***

Si elencano le concentrazioni più consistenti e un individuo marcato.

1 ind. marcato con collare 'IBCK' in Friuli Venezia-Giulia nel 2006, già contattato nel 2007 tra la Foce dell'Isonzo (GO) e a Treviso (BON *et al.*, 2009) è stato segnalato a Silea (TV) il 19 gennaio (P. Vacilotto [1]).

150 indd. a Falconera (VE) il 30 gennaio e 162 indd. il 10 febbraio (G. Sgorlon, A. Nardo [1]).

102 indd. tra le valli di Rosolina e Porto Viro (RO) il 25 novembre (censimenti Sagittaria).

Cigno nero *Cygnus atratus*

4 indd. in Valle Zignago e 2 indd. in Valle Perera (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).

1 ind. a Treviso il 13 aprile e l'11 maggio (S. Davison, A. Mazzocco [1]).

1 cp. a Oderzo (TV) il 21 luglio (G. Sgorlon [1][3]).

3 indd. in Valle Morosina (RO) il 24 settembre (A. Tonelli).

1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 13 ottobre (censimenti Sagittaria).

1 ind. in Valle Segà (RO) il 29 dicembre (censimenti Sagittaria [1]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.

19 indd. a Maserot, S. Giustina Bellunese (BL), il 5 gennaio (M. Cassol, M. Villa, S. Vendrami).

1100 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).

Oca selvatica *Anser anser*

Si elenca la concentrazione più consistente.

930 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).

Oca del Canada *Branta canadensis*

Si elenca una segnalazione al di fuori della provincia di Treviso, dove la specie è stata introdotta in passato.

6 indd. in Valle Dogà (VE) l'8 gennaio (censimenti IW).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (G. Tormen *et al.*).

1 ind. probabilmente a fuga è stato lungamente osservato a Saletto di Piave (TV), dal 20 aprile per alcuni mesi, spesso posato sul campanile (P. Vacilotto, L. Boscain [1]).

Casarca *Tadorna ferruginea*

L'origine degli individui elencati è dubbia.

6 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).

2 indd. in Valle Figheri (VE) l'8 gennaio (M. Bon).

1 ind. a Casella d'Asolo (TV) il 26 febbraio (A. Recco [1]).

1 ind. a Villa Bartolomea (VR) il 15 marzo (A. Berardo [2]).

In Valle Ripiego (RO): 5 indd. l'1 settembre, 2 indd. l'11 settembre e 3 indd. il 23 settembre;

In Valle Morosina (RO) 2 indd. il 2 settembre (D. Trombin, M. Bovo *et al.* [1]).

9 indd. a Valle Vecchia (VE) il 23 novembre (G. Sgorlon [1][3]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

5.188 indd. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).

1.671 indd. in Valle Canocchione (RO) il 17 gennaio (censimenti IW).

560 indd. in mare di fronte allo Scanno Cavallari (RO) il 20 dicembre (D. Trombin [1]).

Anatra mandarina *Aix mandarina*

L'origine degli individui elencati è dubbia.

1 m. a Portogruaro (VE) il 7 gennaio (G. Sgorlon).

1 m. a Faè di Oderzo (TV) il 24 novembre (G. Sgorlon).

Fischione *Anas penelope*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

17.833 indd. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).

53.541 indd. nell'area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).

26.642 indd. in Valle S. Carlo (RO) il 17 dicembre (censimenti Sagittaria).

12.000 indd. in mare di fronte a Scanno Cavallari (RO) il 20 dicembre (D. Trombin [1]).

Canapiglia *Anas strepera*

Si elencano la concentrazione più consistente e un nuovo sito di nidificazione.

1.771 indd. in Po di Maistra, golena Carpano (RO) il 15 gennaio (censimenti IW).

Nidificazione accertata alla Palude del Busatello (VR) in luglio, con la presenza di 1 cp. con 4 pulli (F. Novelli [2]), prima nidificazione in provincia di Verona.

Alzavola *Anas crecca*

Si elenca la concentrazione più consistente.

58.801 indd. in laguna di Venezia, di cui 23.160 indd. in Valle Serraglia (VE) e 11.425 indd. in Valle Morosina (PD), l'8-9 gennaio (censimenti IW).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e un'aberrazione di piumaggio.

15.691 indd. in provincia di Rovigo al censimento di metà gennaio (censimenti IW).

51.108 indd. in laguna di Venezia, di cui 10.623 indd. in Valle Morosina (PD), l'8-9 gennaio (censimenti IW).

1 f. isabellina in Valle Ca' Zuliani (RO) il 28 ottobre (D. Trombin, E. Verza).

Codone *Anas acuta*

Si elenca la concentrazione più consistente.

9.819 indd. in Valle Dogà (VE) l'8 gennaio (censimenti IW).

Marzaiola *Anas querquedula*

Si elencano la concentrazione più consistente e una presenza tardiva.

1.063 indd. nelle zone umide del comune di Porto Viro (RO) il 2 settembre (censimenti Sagittaria).

1 ind. in Valle Chiusa (RO) l'1 novembre (D. Trombin, E. Verza).

Mestolone *Anas clypeata*

Si elenca la concentrazione più consistente.

11.836 indd. nell'area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).

Fistione turco *Netta rufina*

Specie nidificante sporadica, si elenca l'unico sito noto di nidificazione dell'anno.

La specie ha nuovamente nidificato a Valle Vecchia (VE), con la presenza di 1 f. con 7 pulli il 2 luglio (G. Sgorlon [1]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano i casi di svernamento e le presenze in periodo riproduttivo.

4 indd. sul Po di Maistra il 4 gennaio (D. Trombin [1]).

14 indd. a Valle Vecchia (VE) il 7 gennaio (censimenti IW); in questo sito la specie è stata osservata durante tutto il periodo riproduttivo e 27 indd. erano presenti il 30 settembre (L. Boscain [1]).

1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 2 giugno (censimenti Sagittaria).

11 indd. a Valle Vecchia (VE) il 29 dicembre (G. Sgorlon [1]).

Moretta *Aythya fuligula*

Specie svernante regolare, nidificante scarsa, si elencano le concentrazioni più consistenti e un sito di nidificazione.

1.820 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 13 gennaio (M. Sighele *et al.* [2]).

Nuova nidificazione accertata in provincia di Treviso, a Quinto: il 28 giugno erano presenti 16 indd. e 15 pulli (P. Vacilotto [1]).

1.435 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 14 dicembre (M. Sighele [2]).

Moretta grigia *Aythya marila*

3 indd. alla foce di Brenta (VE) il 9 gennaio (M. Bovo, S. Basso).

4 indd. all'incile del Po di Maistra (RO) il 15 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in Po di Maistra, golena Carpano (RO), il 18 gennaio (censimenti IW).

1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 26 gennaio (M. Sighele *et al.* [2]).

1 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 marzo (M. Salata, M. Bovo [1]).

1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 14 dicembre (M. Sighele [2]).

1 f. a Valle Vecchia (VE) il 29 dicembre (G. Sgorlon *et al.* [1]).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

Al Lido di Venezia: 2 ff. il 2 gennaio, 1 m. il 6 gennaio, 1 f. il 6 febbraio, 1 m. il 21 febbraio e il 3 marzo, 1 f. il 14 marzo (S. Castelli, M.G. Mitri [1][3]).

1 ind. a Bardolino (VR) tra il 7 e il 14 gennaio (M. Marconi, M. Sighele *et al.* [2]).

3 indd. in Valle Morosina (PD) l'8 gennaio (N. Baccetti).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

- 1 ind. in mare a Eraclea mare (VE) il 7 gennaio (E. Stival).
18 indd. in mare davanti alla Busa Dritta di Pila (RO) l'11 gennaio (censimenti IW).
30 indd. in mare davanti a Scanno Boa (RO) il 2 febbraio (D. Trombin [1]).
2 indd. a Valle Vecchia (VE) il 6 marzo (G. Sgorlon [2]).
1 ind. spiaggiato a Porto S. Margherita, Caorle (VE), il 14 luglio (L. Panzarin).

Orco marino *Melanitta fusca*

Si elencano le concentrazioni più significative.

- 80-91 indd. al Lido di Venezia tra il 4 dicembre 2007 e il 9 febbraio (M.G. Mitri, S. Castelli [1]).
Un gruppo di 70-77 indd., numero interessante per le acque interne italiane, è stato osservato nei pressi di Bardolino (VR) tra il 5 e il 13 gennaio (M. Azzolini, M. Sighele *et al.* [1][2] – cfr. BON *et al.*, 2009).
143 indd. nel tratto di litorale compreso tra Foce Tagliamento e Porto Baseleghe (VE) il 7 gennaio (F. Piccolo, R. Andrea).
13-30 indd. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – Lazise (VR), tra il 13 e il 25 dicembre (C. Izzo, M. Sighele, V. Fanelli [1][2]).

Pesciaiola *Mergus albellus*

- 1 f. al Lago di Santa Croce (BL) il 6 gennaio (A. De Faveri, A. Antonioli, L. Azzalini).
1 m. a Casale sul Sile (TV) il 19 gennaio (P. Vacilotto [1]).
1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 26 gennaio (M. Sighele *et al.* [2]).

Smergo minore *Mergus serrator*

Si elenca la concentrazione più consistente.

- 149 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l'11 gennaio (censimenti IW).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano le segnalazioni al di fuori delle province di Treviso e Belluno, dove la specie è osservata tutto l'anno e nidificante.

- 1 f. a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR), il 2 marzo (C. Izzo [2]).
1 f. a Garda (VR) il 13 e il 14 dicembre (C. Izzo, G. Dalle Vedove [2]).
4 ff. a Punta San Vigilio (VR) il 14 dicembre (M. Sighele, V. Fanelli [2]); forse una di queste 4 ff. era la stessa segnalata nella vicina Garda.

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

- 1 f. sul Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), dal 25 novembre 2007 al 13 gennaio (M. Sighele, R. Lercio [1][2] - cfr. BON *et al.*, 2009).

Gaviiformes**Gaviidae****Strolaga mezzana *Gavia arctica***

Specie migratrice e svernante regolare in mare e sul Lago di Garda, si elencano la concentrazione più consistente e una presenza in periodo inusuale.

71 indd. tra Punta San Vigilio e Malcesine e 3 indd. a Peschiera del Garda (VR) il 13 gennaio (M. Azzolini *et al.* [1][2]).

1 ind. osservato a Pellestrina (VE) fino al 22 giugno (F. Antinori [3]).

Procellariiformes**Procellariidae****Berta minore *Puffinus yelkouan***

2 indd. alcune miglia al largo di Boccasette (RO) l'1 aprile (G. Ferrari, D. Trombin [1]).

Pelecaniformes**Sulidae****Sula *Morus bassanus***

1 subad. alla Foce del Livenza (VE) il 3 luglio (G. Piras [3]).

2 indd. in Valle Dogà (VE) il 7 luglio (L. Panzarin).

Phalacrocoracidae**Cormorano *Phalacrocorax carbo***

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

3.012 indd. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).

4.464 indd. nell'area del Delta del Po (RO) al censimento dei *roost* di metà gennaio (censimenti IW).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

*Specie osservata negli ultimi anni con sempre maggiore regolarità, numeri più consistenti e durante tutto l'anno in laguna di Venezia e nel Delta veneto, mentre fino a pochi anni fa era considerata specie accidentale (FRACASSO *et al.*, 2000); si elencano le concentrazioni più numerose.*

279 indd. in Valle Cavallino (VE) l'8 gennaio (censimenti IW).

245 indd. in Canale Fisolo (VE) il 6 settembre (R. Faè, L. Sattin); alcuni portavano anelli colorati di provenienza croata.

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

Si elencano le concentrazioni più consistenti, le presenze in acque interne e un nuovo sito di nidificazione.

460 indd. a Cinto Caomaggiore (VE) il 7 gennaio (G. Sgorlon [1]).

Nidificazione accertata per la prima volta in provincia di Rovigo in due diversi siti: 50-60 cpp. sul Po di Maistra e 15-20 cpp. a Valle Morosina (VERZA & TROMBIN, 2008).

1 ind. in volo sopra Oderzo (TV) il 18 maggio (G. Sgorlon).

1 ind. a San Donà del Piave (TV) dal 18 maggio al 26 giugno (G. Sgorlon).

1 ind. sul Piave a Salgareda (TV) il 24 maggio (G. Sgorlon).

3 indd. alle Grave di Negrizia (TV) dal 26 luglio al 21 agosto (G. Sgorlon [1]).

1 ind. a Tempio di Ormelle (TV) il 26 agosto (G. Sgorlon).

2.573 indd. al roost in Po di Maistra (RO) il 25 novembre (M. Mirimin, L. Sattin).

Ciconiiformes***Ardeidae*****Tarabuso *Botaurus stellaris***

Si elencano i siti di svernamento con le maggiori concentrazioni.

6 indd. alle cave di Gaggio-Marcon (VE) il 19 gennaio (M. Pegorer).

5 indd. al Feniletto, Vallese di Oppeano (VR), il 20 gennaio (M. Morbioli [2]).

Tarabusino *Ixobrychus minutus*

Si elencano le presenze in date o siti inusuali.

1 ind. a Cusignana di Giavera (TV) il 10 gennaio (G. & N. Silveri [1]).

1 m. al Lago di Busche (BL) il 29 giugno (M. Zenatello).

1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 19 dicembre (G. Silveri [1]).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Si elencano le concentrazioni più consistenti al di fuori del periodo riproduttivo.

110 indd. in Adige (VE), di fronte a Valle Morosina il 10 e il 21 gennaio (censimenti IW).

In Po di Maistra, golena Carpano (RO), 102 indd. il 15 gennaio e 92 indd. l'11 marzo (M. Carnacina, L. Cogo, L. Sattin *et al.*). Successivamente, 125 indd. l'11 settembre, 134 indd. il 25 novembre e 91 indd. il 30 dicembre (censimenti Sagittaria).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Si elenca un nuovo sito di nidificazione.

Nidificazione accertata per la presenza di juvv. alla Palude Pellegrina (VR) il 26 luglio (C. Izzo *et al.* [2]); prima nidificazione accertata in provincia di Verona dopo circa un secolo (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Si segnalano solo le osservazioni di gruppi di almeno 200 unità in periodo invernale e un nuovo sito di nidificazione.

300 indd. a San Martino Buonalbergo (VR) il 7 gennaio (C. Isotta [2]).
 210 indd. ai Prai di Castel di Godego (TV) il 25 gennaio (G. Silveri [1][3][5]).
 200 indd. a Povegliano (VR) il 18 dicembre (V. Fanelli [2]).
 250 indd. a Castelfranco Veneto (TV) e altri 250 indd. a Nervesa (TV) il 18 e il 23 dicembre (P. Rossato, G. Silveri, F. Zanatta [1]).
 300 indd. a Tombazosana (VR) il 30 dicembre (M. Morbioli [2]).
 È stata accertata per la prima volta la nidificazione in provincia di Verona, in due diversi siti: Oasi Brusà-Vallette (F. Sestili, R. Pollo [2]) e Palude Pellegrina (C. Izzo, M. D'offria [2]).
 Prima nidificazione, con poche coppie, anche in provincia di Treviso presso l'oasi Cervara di S. Cristina di Quinto (F. Ramponi, F. Mezzavilla).

Garzetta *Egretta garzetta*

Si elenca la concentrazione più consistente.

Stimati circa 2.000 indd. al *roost* del Po di Maistra, golena Carpano (RO), l'11 settembre (D. Trombin).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

Si elenca la concentrazione più consistente.

700 indd. in Po di Maistra, golena Carpano (RO), l'11 settembre (D. Trombin).

Airone rosso *Ardea purpurea*

Si elenca la segnalazione più tardiva.

2 indd. a Boccasette (RO) l'1 novembre (D. Trombin, E. Verza).

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

1 ind. a Crocetta del Montello (TV) il 20 e il 27 marzo (G. Silveri [1]).

1 ind. a Pederobba (TV) il 6 aprile e 2 indd. il 17 aprile (G. Silveri, P. Vacilotto [1]).

1 ind. a Mel (BL) il 15 aprile (M. Villa).

1 ind. nella Piana del Cansiglio (BL) il 16 aprile (D. Serafin).

1 ind. a San Donà del Piave (TV) il 22 maggio (G. Sgorlon [1]).

1 ind. al Lago del Corlo (BL) l'1 luglio (G. Silveri [1]).

1 ind. a Padova il 5 luglio (G. Piras [1]).

1 ind. in Valle del Mis (BL) il 15 luglio (G. Silveri [1]).

1 ind. a Castelcuoco (TV) il 31 luglio (G. Silveri [1]).

1 ind. in migrazione sui Colli Asolani (TV) il 17 agosto e 3 indd. il 27 agosto (F. Piccolo, G. Silveri *et al.* [1]).

1 ad. e 2 juv. a Pederobba (TV) il 23 settembre (G. Silveri [1]).

1 ind. a Monselice (PD) il 24 ottobre (A. Berardo [2]).

3 indd. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) durante la migrazione post-riproduttiva (A. Gargioni *et al.* [4]).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Si elenca un'importante concentrazione.

42 indd. a Pez, Cesiomaggiore (BL), il 24 aprile (M. Cassol, M. Corriani).

Threskiornithidae**Mignattaio *Plegadis falcinellus***

1 ind. in Valle Ca' Pisani (RO) il 10 ed il 17 gennaio, il 23 febbraio, il 24 marzo e il 6 giugno (R. Faè, E. Di Gangi, L. Sattin *et al.* [1]).

1 ind. l'11 maggio in Busa di Scirocco (RO) (N. Donà).

1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 26 maggio (censimenti Sagittaria).

1 ind. a Bibione (VE) il 23 luglio, 3 indd. il 31 luglio e 2 indd. il 10 agosto (P. Bonvicini, A. Turri, E. Stival, M. Pegorer, G. Sgorlon [1][3]).

1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 2 settembre (D. Trombin).

1 ind. a Nogarole Rocca (VE) il 13 ottobre (M. Zenatello [2]).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

6 indd. in Po di Tolle (RO) l'11 gennaio (censimenti IW).

4 indd. al *roost* notturno di ardeidi sul Po di Tolle (RO) il 5 febbraio (D. Trombin [1]).

1 ind. a Ca' Venier, Porto Tolle (RO), il 29 ottobre (V. Tugnolo [5]).

4 indd., di cui 1 al *roost* della Carpano e 3 al *roost* di Tolle (RO), il 25 novembre (censimenti Sagittaria).

3 indd. in Valle Sacchetta (RO) il 29 novembre (W. Muratori).

1 ind. al *roost* della Carpano, Po di Maistra (RO), il 30 dicembre (censimenti Sagittaria).

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e un nuovo sito di nidificazione.

76 indd. in Valle Dogà (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).

Nidificazione accertata di almeno 2 cpp. sul Po di Maistra (RO), prima nidificazione per la provincia di Rovigo (VERZA & TROMBIN, 2008).

In Valle Ca' Zuliani (RO) 46 indd. l'1 settembre e 163 indd. il 23 settembre (D. Trombin *et al.* [1]).

Phoenicopteriformes***Phoenicopteridae*****Fenicottero *Phoenicopus roseus***

Si elencano una interessante concentrazione invernale, un nuovo sito di nidificazione, un sito inusuale, individui marcati.

2.096 indd. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).

1 ind. sull'Adige nel centro urbano di Verona dal 23 al 26 gennaio (G. Turco, A. Petronio, M. Sighele *et al.* [1][2]); rappresenta l'unica osservazione conosciuta di questa specie in ambiente

urbano fluviale. Qualche giorno prima, 3 indd. erano stati osservati nella periferia sud di Verona (C. Isotta [2]).

Prima nidificazione portata a termine per il Veneto, accertata in Valle Dogà, Laguna Nord di Venezia (L. Panzarin). I primi 2 pulli sono stati osservati il 29 aprile, quando i nidi erano 35; il 7 luglio erano presenti 22 pulli, 173 i nidi. Sono stati inanellati 7 pulli il 17 luglio, uno di questi è stato segnalato in Tunisia il 23 gennaio 2009. Si segnala inoltre che il 25 agosto una grandinata eccezionale ha colpito circa 300 indd. Nel 2007 vi era stato un tentativo di nidificazione in Valle Dragojesolo (VE), con abbandono del nido (BON *et al.*, 2009; BACCETTI *et al.*, 2008).

1 ind. in Valle Bagliona (RO) il 23 giugno marcato con anello colorato, ind. nato in Turchia nel 2007 (L. Sattin).

100 indd. in Valle Olivara (VE) il 17 luglio, tra loro alcuni inanellati a Comacchio, 1 in Sardegna e 1 nel Delta dell'Ebro (D. Fasano [3]).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

Si elenca la concentrazione più consistente.

1.393 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 13 gennaio (censimenti IW).

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

3 indd. tra Punta San Vigilio e Malcesine (VR) il 13 gennaio (M. Azzolini *et al.* [1][2]).

1 ind. in Sacca del Canarin (RO) il 5 febbraio (A. Favaretto [1]).

1 ind. a Lio Piccolo (VE) l'1 novembre (A. Piazza [1][3]).

1 ind. in Laguna di Caleri (RO) il 15 e il 22 dicembre (N. Donà, A. Tonelli [1][5]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 16 e il 22 novembre e il 27 dicembre (F. Trave, M. Passarella, E. Stival *et al.* [1][5]).

1 ind. al Lido di Venezia il 27 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri [1]).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.

890 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 15 gennaio (P. Ronconi).

1 ind. al Lago di Busche (BL) il 14 giugno (L. Boscain, S. Davison).

Falconiformes
Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si elencano un conteggio e i periodi inusuali.

1 ind. in Po di Maistra (RO) il 17 gennaio (E. Di Gangi, D. Trombin [1]).

1 ind. a Polesine Camerini (RO) il 9 luglio (D. Trombin [1]).

Durante la migrazione post-riproduttiva sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) sono stati conteggiati 14.240 indd. tra il 15 agosto e il 6 settembre (A. Gargioni *et al.* [1][4]).

Nibbio reale *Milvus milvus*

1 ind. a Valle Chiusa (RO) l'1 marzo (G. Piras, C. Fassina [1]).

2 indd. alle Grave di Ciano (TV) il 17 aprile (G. Silveri [1]).

1 ind. sul Monte Tomba (BL) il 19 agosto (L. Panizzolo [1]).

1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 13 ottobre (M. Zenatello [2]).

1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) tra il 20 e il 23 ottobre (A. Tonelli [1]).

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. a Musile sul Piave (TV) l'8 marzo (M. Cappelletto [1]).

3 indd. a Borso del Grappa (TV) il 15 giugno (C. Rech [1]).

1 ind. a Rocca Pendice, Colli Euganei (PD), il 16 giugno (S. Bottazzo [1]); subito il *mobbing* di 4 falchi pellegrini, si è diretto verso il Monte Madonna.

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. a Lugugnana (VE) il 22 marzo (L. Boscain [1]).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

1 ind. alle Grave di Negrizia (TV) dal 26 maggio al 7 giugno (G. Sgorlon).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 5 e il 22 settembre (S. Davison, G. Silveri [1]).

1 ind. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 6 settembre (A. Gargioni *et al.* [1]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 settembre (D. Trombin [1]).

1 ind. a Boccasette (RO) il 12 novembre (A. Tonelli [1]).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ind. in Valle Ripiego (RO) il 15 gennaio (D. Trombin, P. Ronconi [1]).

1 ind. alle Grave di Negrizia (TV) il 25 gennaio (G. Sgorlon [1]).

1 ind. a Marcon (VE) il 17 marzo (E. Stival [1]).

1 ind. subad. a Pegolotte di Cona (VE) dal 31 marzo al 9 aprile (A. Tonelli [1][5]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 24 novembre (G. Silveri [3][5]).

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina*

1 ind. in migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 25 agosto (P. Bonvicini [1][4]).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. a Boccasette (RO) l'1 marzo (G. Piras, C. Fassina [1]).

1 ind. in forma chiara sui Colli Euganei (PD) il 21 maggio (A. Tonelli, S. Bottazzo [1]).

1 ind. in forma scura sui Colli Euganei (PD) il 22 settembre (A. Tonelli [1][5]).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Si segnala un'osservazione curiosa.

Nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 2 indd. sono stati osservati precipitare sulla strada agordina il 26 settembre, occupati in una disputa. Mentre uno dei due indd. ha subito ripreso il volo, l'altro è stato sottoposto con successo a cure e quindi inanellato da A. De Favero prima del rilascio (G. Tormen [1]).

Pandionidae**Falco pescatore *Pandion haliaetus***

Si elenca una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. presso l'ex-valle Moceniga (RO) il 21 giugno (N. Donà).

Falconidae**Grillaio *Falco naumanni***

5 mm. e 2 ff. osservati alla Bonifica di Loncon (VE) tra il 5 e il 23 maggio (G. Sgorlon, A. Nardo [1]).

1 ind. a Pozzonovo (PD) il 6 maggio (A. Tonelli [1]).

4 indd. a Nervesa della Battaglia (TV) il 26 maggio (G. Silveri [1]).

1 ind. a Montebello (VI) il 31 maggio (S. Davison [2]).

Gheppio *Falco tinnunculus*

Si segnala un nuovo sito riproduttivo in ambiente urbano.

Nidificazione accertata a Treviso sulla Chiesa di S. Nicolò (F. Mezzavilla, G. Zanatta); prima nidificazione per il centro urbano di Treviso.

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Si elencano la concentrazione più consistente e le osservazioni in date interessanti.

90 indd. ca. a Sprocara, Villa Bartolomea (VR), tra l'8 e il 13 maggio (E. Bardo, V. Dini *et al.* [1][2]).

1 cp. nidificante in Bonifica di Loncon (VE) a fine maggio in un nido già noto; una seconda

coppia ha frequentato la zona tra il 10 giugno e il 6 agosto senza nidificare (L. Panzarin, G. Sgorlon, A. Nardo).

1 m. ad. a Pozzonovo (PD) il 7 luglio (A. Tonelli [1][5]); nello stesso sito l'anno precedente era stato osservato 1 juv.

1 f. ad. a Taglio di Po (RO) il 9 luglio (D. Trombin [1]).

Smeriglio *Falco columbarius*

Si elenca la concentrazione più importante.

6 indd. al roost serale al Busatello (VR) il 18 gennaio (F. Novelli [2]); il roost ha perso consistenza negli ultimi anni.

Lodolaio *Falco subbuteo*

Si elencano periodo o sito inusuale.

1 ind. a Tessera (VE) l'1 marzo (E. Stival [1]); segnalazione precoce.

Gruppo familiare di 5 indd. presso Ca' Emo di Adria (RO) il 9 settembre (D. Trombin).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Si elencano nuovi siti riproduttivi, un'aberrazione cromatica e un individuo marcato.

1 ind. in leucismo parziale sui Colli Euganei (PD) l'11 febbraio (A. Tonelli [1]).

Possibile nidificazione in nuovo sito della provincia di Rovigo, sulla centrale ENEL di Polesine Camerini (E. Verza *et al.* [1]).

1 juv. involato da poco a Lugugnana (VE) l'8 luglio (L. Panzarin).

Accertata nidificazione in cassetta nido sull'Altopiano di Asiago (VI), con l'involto di 2 juvv. (L. Zangobbo); la cassetta nido era stata posizionata 4 anni prima.

1 ind. in difficoltà recuperato a Mestre (VE) il 6 agosto (L. Panzarin); marcato e liberato, è stato trovato morto in Toscana il 4 febbraio 2009.

Gruiformes

Rallidae

Schiribilla *Porzana parva*

Si elenca l'unico sito regionale noto di probabile nidificazione.

1-3 indd. osservati a Valle Vecchia (VE) tra il 22 marzo e il 6 settembre, quando è stato anche osservato 1 juv. (L. Boscain *et al.* [1]).

Re di quaglie *Crex crex*

Si elenca la concentrazione più consistente.

13 indd. in canto sul Col Visentin (TV) tra giugno e luglio, tutti nella stessa area (F. Mezzavilla, S. Lombardo).

Folaga *Fulica atra*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e le aberrazioni di piumaggio.

- 28.530 indd. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).
4.087 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 13 gennaio (censimenti IW).
14.801 indd. nell'area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).
1 ind. in leucismo parziale a Peschiera del Garda (VR) il 9 gennaio (E. Cavallini [2]).
1 ind. in leucismo parziale in Valle Ripiego (RO) il 25 novembre (M. Bovo).

Gruidae

Gru Grus grus

Specie migratrice regolare, si riportano solo le osservazioni di gruppi numerosi e le segnalazioni invernali.

- 2 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (G. Tormen *et al.*).
2 indd. in Bonifica Veronese (VE) l'8 gennaio (A. Favaretto).
8 indd. a Colfosco (TV) l'8 gennaio (M. Favero [1]).
15 indd. a Loria (TV) il 15 gennaio (F. Zanatta [1]).
4 indd. a Treviso il 24 gennaio D. Comin [1][5].
2 indd. a Vigasio (VR) il 26 gennaio (A. Mosele [2]).
20 indd. in volo sopra San Pietro di Legnago (VR) il 5 marzo (A. Berardo [2]).
200 indd. in volo sopra Arcugnano (VI) il 5 marzo (G. Fracasso [2]).
20 indd. in sosta a Sustinenza di Casaleone (VR) il 10 marzo (M. Pesente [2]).
112 indd. in volo e poi posati a Giare di Mira (VE) il 10 marzo (M. Passarella [1][5]).
100 indd. in volo sopra Mestre (VE) il 14 marzo (U. Bastianelli [1]).
65 indd. in Valle Baglioncina (RO) il 13 novembre (W. Muratori).
60 indd. in volo sopra Adria (RO) il 14 novembre (D. Trombin [1]).
200 indd. a Belvedere di Volpago (TV) il 16 novembre (*vide* P. Vacilotto [1]).
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 14 dicembre (G. Sgorlon [1][3]).
5 indd. a Moriago della Battaglia (TV) il 19 dicembre (G. Silveri [1]).

Charadriiformes

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si elenca la concentrazione più consistente.

- 300 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 marzo (F. Piccolo, F. Trave [1]).

Recurvirostridae

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.

- 1 ind. al Feniletto, Vallese di Oppeano (VR), il 7 aprile, prima osservazione segnalata per la provincia di Verona dopo oltre un secolo (M. Sighele [2]).
Stimati 2.000 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) il 31 dicembre (N. Donà).

Burhinidae**Occhione *Burhinus oediceus***

1-3 ind. alle Grave di Ciano (TV) durante il periodo riproduttivo a partire dal 17 aprile (G. Silveri [1]), unico sito regionale noto di possibile nidificazione.

Charadriidae**Piviere tortolino *Charadrius morinellus***

2 ind. sul Monte Toraro (VI) il 19 agosto (L. Sebastiani).
1 juv. sul Monte Pizzoc (TV) tra il 4 e il 7 settembre (R. Storer, F. Corvaja, P. Vacilotto [1]).
2 ind. sul Nevegal (BL) il 6 settembre (F. Pegoraro).
2 ind. sul Monte Grappa (TV) il 10 settembre (L. Boscain [1][5]).

Scolopacidae**Piovanello pancianera *Calidris alpina***

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

21.966 ind. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).
8.586 ind. nell'area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

1 ind. a Tessera (VE) il 30 luglio (E. Stival [1][3]).

Crocolone *Gallinago media*

1 ind. a Ponte Crepaldo, Eraclea (VE), il 6 marzo (L. Panzarin).

Pittima reale *Limosa limosa*

Si elencano le concentrazioni più consistenti dei due periodi migratori.

1.224 ind. nelle Valli di Porto Viro (RO) il 25 marzo (censimenti Sagittaria).
440 ind. in Valle Ca' Pisani (RO) il 2 settembre (censimenti Sagittaria).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Si segnala un sito inusuale.

3 ind. nei pressi di Nogara (VR) il 7 aprile (M. Sighele [2]); specie assai sporadica in provincia di Verona.

Voltapietre *Arenaria interpres*

Si elencano le osservazioni invernali.

4 ind. in Laguna inferiore (VE) il 9 gennaio (censimenti IW).
12 ind. in Sacca di Scardovari (RO) l'11 gennaio (censimenti IW).
1 ind. sullo scanno Cavallari (RO) il 18 gennaio (censimenti IW).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

1 ind. in Valle Ca' Pisani (RO) il 25 aprile (P. Venturi).

2 indd. in Valle Pagliaga (VE) il 25 settembre (G. Cimenti [1][3]).

Stercorariidae**Labbo *Stercorarius parasiticus***

1 ind. a Eraclea mare (VE) il 31 marzo (G. Sgorlon [1]).

2 indd. in forma scura a Porto Barricata (RO) il 5 aprile (G. Basso, L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo [1][5]).

1 ind. al Lido di Venezia il 21 aprile (S. Castelli [1][3]).

1 ind. a Boccasette (RO) il 26 giugno ed il 10 luglio (D. Trombin).

1 ind. alla Foce del Po di Levante (RO) il 25 luglio (D. Trombin [1]).

1 ind. a Porto Barricata (RO) il 19 ottobre (L. Boscain, P. Vacilotto [1][5]).

Laridae**Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei***

2 indd. in Valle Spolverina (RO) l'8 aprile (G. Ferrari, D. Trombin).

16 indd. in Valle Bagliona (RO) il 23 aprile e 2 indd. il 26 maggio (E. Verza *et al.* [1]).

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Si elencano un individuo marcato e le aberrazioni di piumaggio.

1 ind. albino a Padova il 14 gennaio (L. Boscain [1]).

1 ind. con anello polacco a Casale sul Sile (TV) tra febbraio e marzo (S. Catterin [1]).

1 ind. in leucismo parziale osservato a Padova tra il 26 e il 28 marzo (M. Basso [5]).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.

3.366 indd. in laguna di Venezia l'8-9 gennaio (censimenti IW).

1 ind. del 1° inverno a Lido Campanello, Castenuovo del Garda (VR), il 10 e il 19 ottobre (R. Lerco, M. Allen [2]).

Gabbiano corso *Larus audouinii*

1 ad. a Valle Vecchia (VE) il 28 dicembre (P. & L. Casali [1]); seconda osservazione nota dell'ultimo decennio, la prima di un ad., per la provincia di Venezia e per il Veneto.

Zafferano *Larus fuscus*

1 ad. a Lido Ronchi, Castelnovo del Garda – Lazise (VR), il 5 gennaio (M. Sighele, C. Izzo *et al.* [2]).

1 ad. a Peschiera del Garda (VR) il 18 ottobre (C. Izzo, C. Chiappisi [2]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 novembre (M. Passarella [5]).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Migratore regolare, si riportano solo le segnalazioni invernali di gennaio e dicembre.

5 indd. nella discarica di Lugugnana (VE) il 7 gennaio (M. Basso).

3 indd. nella discarica di Jesolo (VE) il 7 gennaio (L. Panzarin).

1 ind. a Pila (RO) il 10 gennaio (L. Boscain, F. Piccolo [1][5]).

2 indd. a Verona il 27 gennaio (R. Lerco [2]).

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 23 dicembre (P. & L. Casali [1]).

7 indd. tra le valli Morosina e Segà (RO) il 29 dicembre (D. Trombin).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

1 ind. nella discarica di Lugugnana (VE) il 7 gennaio (M. Basso).

1 ind. a Verona il 27 gennaio (R. Lerco [2]).

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 23 novembre (G. Sgorlon [1][3]).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ad. a Peschiera del Garda (VR) tra il 18 e il 25 ottobre (C. Izzo, C. Chiappisi *et al.* [2]).

1 ind. del 1° inverno a Peschiera del Garda (VR) il 19 ottobre (M. Sighele *et al.* [2]).

Sternidae**Sterna maggiore *Hydroprogne caspia***

Si elenca la concentrazione più consistente.

45-78 indd. in Valle San Carlo e Ca' Zuliani (RO) tra l'1 e il 23 settembre (D. Trombin *et al.* [1]).

Mignattino comune *Chlidonias niger*

Si elenca la concentrazione più consistente.

600 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 27 luglio (L. Boscain, N. Cendron, P. Vacilotto).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

1-3 indd. a Valle Vecchia (VE) tra l'1 e l'11 maggio (S. Tasca, L. Boscain *et al.* [1]).

1 ind. in Palude di Cona (VE) l'11 maggio (L. Boscain, S. Davison, F. Piccolo, F. Trave, P. Vacilotto [1]).

3 indd. in Laguna del Basson, Porto Tolle (RO), il 5 luglio (N. Donà).

Columbiformes***Columbidae*****Colombella *Columba oenas***

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

352 indd. a Cavarzere (VE) il 16 febbraio (A. Tonelli [1]).

70 indd. nel comune di Casaleone (VR) a partire dal 20 dicembre (M. Pesente [2]); hanno poi svernato in zona oltre 150 indd. fino ad almeno il 14 febbraio 2009 (M. Sighele, R. Lerco [2]).

Psittaciformes***Psittacidae*****Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri***

Si elencano la concentrazione più consistente e siti inusuali.

1 ind. a Santa Bona (TV) tra settembre 2007 e il 9 marzo (S. Davison [1]).

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 31 luglio (G. Sgorlon).

45 indd. a Villa Bartolomea (VR) l'1 novembre (A. Berardo [2]); gruppo consistente in noto sito riproduttivo.

Cuculiformes***Cuculidae*****Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius***

1 ind. a Scardovari (RO) il 9 maggio (M. Pratesi [1]).

1 ad. e 1 juv. presso la centrale ENEL di Polesine Camerini (RO) il 9 luglio (D. Trombin [1]).

Strigiformes***Strigidae*****Assiolo *Otus scops***

Si segnalano individui marcati.

1 ind. ricatturato il 14 aprile alla stazione di inanellamento di Ca' Roman (VE), dove era stato inanellato l'anno precedente; tra il 14 aprile e il 14 maggio inanellati 18 indd. (L. Sattin, M. Bovo).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. a Cinto Caomaggiore (VE) il 7 gennaio (G. Sgorlon [1]).

1 ind. al Lido di Venezia il 9 gennaio (S. Castelli, M.G. Mitri [1]).

1 ind. a Palude di Cona (VE) il 9 marzo (R. Storer [1]).

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 25 marzo (G. Sgorlon [1]).

1 ind. a Treviso il 13 aprile (S. Davison [1]).

1 ind. a Brentino Belluno (VR) in maggio (C. Frapporti).

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Si segnala un individuo marcato.

1 f. in cova in cassetta nido nel Cansiglio (TV): grazie alla lettura dell'anello con cui era marcata si è risaliti all'età di 5 anni (F. Mezzavilla, S. Lombardo).

Coraciiformes**Coraciidae****Ghiandaia marina *Coracias garrulus***

- 1 ind. a Ca' Mello, Porto Tolle (RO), il 10 maggio (M. Basso, S. Tenan [1]).
1 ind. a Salgareda (TV/VE) il 21 e il 23 maggio (G. Sgorlon, A. Piazza [1][3]).
2 indd. alle Grave di Ciano (TV) dal 26 maggio al 29 giugno (G. Silveri [1]).
1 ind. presso la Sacca di Scardovari (RO) il 31 maggio e l'1 giugno; il 30 maggio era stata trovata la carcassa di un altro ind. (D. Trombin [1]).
1 ind. a Porto Levante (RO) tra il 2 e il 9 giugno (B. Moretti [1]).
1-3 indd. Pegolotte di Cona (VE) tra il 3 e il 9 giugno (A. Tonelli [1]).
1 ind. con imbeccata a Pozzonovo (PD) il 12 giugno; in seguito osservata 1 cp. fino al 19 giugno (A. Tonelli [1]).
1 ad. a Ca' Emo di Adria (RO) il 12 giugno (D. Trombin).
1 juv. a Ca' Emo di Adria (RO) il 15 agosto (D. Trombin).
2 indd. a San Giorgio di Livenza (VE) tra il 15 e il 20 giugno (L. Panzarin, G. Sgorlon [1]).
2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 30 giugno e l'1 luglio (S. Bottazzo, A. Tonelli [1]).
Nidificazione accertata di 1 cp. nel comune di Villa Bartolomea (VR) con pulli involati in luglio (V. Dini, M. Pesente *et al.* [2]); prima nidificazione accertata per il Veronese.
1 juv. da poco involato a Jesolo (VE) il 16 agosto (L. Panzarin).

Piciformes**Picidae****Picchio cenerino *Picus canus***

- 1 ind. sul Monte Grappa (TV) il 15 gennaio (G. Silveri *et al.* [1]).

Picchio nero *Dendrocopos martius*

Si segnalano siti inusuali.

- 1 ind. alle Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 24 gennaio (M. Pegorer [1]).
1 ind. recuperato in difficoltà a Mort di Eraclea (VE) il 29 settembre (L. Panzarin).

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

- 1 ind. nei pressi del Canale Ongaro, Caorle (VE), tra il 23 e il 30 ottobre (G. Sgorlon [1][3]).

Passeriformes**Hirundinidae****Topino *Riparia riparia***

Si elenca la concentrazione più consistente e una segnalazione a quota elevata.

1 ind. a S. Giorgio, Bosco Chiesanuova (VR), 1.600 m slm, il 14 luglio (C. Izzo [2]).
4.000 indd. in *roost* su campo di mais a Giare di Mira (VE) tra fine luglio e il 4 agosto (R. Faè, L. Sattin).

Rondine *Hirundo rustica*

Si segnalano le osservazioni più tardive.

1 ind. a Verona l'1 e il 3 dicembre (P. Nascimben [2]).

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

4 indd. in Valle Dogà (VE) il 14 aprile (L. Panzarin).

1 ind. a Ca' Mello (RO) il 6 maggio (D. Trombin).

1 ind. a Oderzo (TV) il 24 settembre (G. Sgorlon [1][3]).

Calandro maggiore *Anthus richardi*

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 18 aprile (L. Panzarin [1]).

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 23 novembre (G. Sgorlon [1][3]).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

3 indd. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 4 maggio (M. Sighele [2]).

1 ind. in Valle San Carlo (RO) l'1 settembre (D. Trombin *et al.* [1]).

Ballerina nera *Motacilla alba yarrellii*

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) tra il 4 marzo e l'1 aprile (G. Sgorlon [1]).

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

1 ind. a Maserada del Piave (TV) il 26 dicembre (P. Vacilotto [1]).

1 ind. a Malga Canidi, Mel (BL) il 26 dicembre (M. Villa).

7 indd. a Gallio (VI) il 31 dicembre (C. Lunardi [1]).

Turdidae

Pettirosso *Erithacus rubecula*

Si elenca un individuo marcato in periodo riproduttivo in sito inusuale.

1 ind. catturato e inanellato a Ca' Roman (VE) il 4 maggio mostrava placca incubatrice (L. Sattin, M. Bovo).

Usignolo maggiore *Luscinia luscinia*

1 ind. catturato e inanellato a Ca' Roman (VE) il 2 settembre (L. Sattin [1]).

Monachella *Oenanthe hispanica*

1 ind. al Lido di Venezia il 18 aprile (S. Castelli [1][3]).

Codirossone *Monticola saxatilis*

Si elenca un sito inusuale.

1 m. a Scardovari (RO) il 1°8 maggio (M. Pratesi [1]).

Sylviidae**Bigia padovana *Sylvia nisoria***

1 ind. a Mestre centro (VE) il 22 maggio, deceduto per probabile impatto con una vetrata a specchio (M. Semenzato).

1 ind. a Lubiara (VR) il 25 maggio (G. Favero [2]).

2 indd. sul Monte Luppia (VR) il 28 maggio (L. Longo [2]).

Sterpazzolina comune *Sylvia cantillans*

Specie che nei precedenti resoconti ornitologici (dal 1991 al 2007) è stata segnalata solo 8 volte in 7 anni diversi (MEZZAVILLA et al., 1999; BON & SEMENZATO, 2002; BON et al., 2004; BON et al., 2009) nonostante sia considerata migratrice regolare poco numerosa (CERATO, 1990); nel 2008 si è registrato un aumento delle segnalazioni.

1 ind. a Montiron (VE) il 4 aprile (E. Stival [1]).

1 ind. a Treviso il 4 aprile (R. Storer [1]).

1 ind. a Rosolina Mare (RO) il 5 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo [1][5]).

1 ind. a Santa Bona (TV) l'11 aprile (S. Davison [1]).

11 indd. catturati e inanellati a Ca' Roman (VE) tra il 16 aprile e il 14 maggio (L. Sattin, M. Bovo).

1-2 indd. a Valle Vecchia (VE) tra il 26 aprile e il 2 maggio (S. Davison [1][3]).

1 ind. catturato e inanellato alle Cave Gaggio, Marcon (VE), il 3 maggio (E. Stival, P. Basciutti [3]).

Lui siberiano *Phylloscopus collybita tristis*

1-3 indd. hanno svernato al Busatello (VR), presenti dal 18 novembre 2007 al 23 marzo (M. Pesente, F. Novelli, P. Maragna [2] – cfr. BON et al., 2009).

1 ind. catturato al Busatello (VR) il 9 novembre è stato ricatturato il 16 novembre, quando era presente anche un secondo ind. (M. Pesente, F. Novelli, P. Maragna [2]).

Muscicapidae**Balia dal collare *Ficedula albicollis***

1 ind. a Trepalade, Quarto d'Altino (TV), il 13 aprile (G. Bruscaignin [2]).

1 ind. in cava Angioletti (VE), il 19 aprile (M. Chillon, L. Bedin [2]).

1 ind. alla Palude di Onara (PD) l'1 maggio (L. Zangobbo).

1 ind. a Santa Bona (TV), il 3 settembre (S. Davison [1]).

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Si elencano individui marcati.

1 ind. catturato a Ca' Roman (VE) il 3 maggio era già stata precedentemente inanellato nei pressi di Roma il 28 aprile 2006 (L. Sattin, M. Bovo).

1 ind. catturato a Ca' Roman (VE) il 4 maggio era già marcato con anello russo (L. Sattin, M. Bovo [1]).

Timalidae**Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea***

Si conferma la presenza di una piccola popolazione sui Colli Euganei (PD); segnalati 5-6 indd. sia a giugno che a novembre (M. Nordio, M. Passarella [1][5]).

Laniidae**Averla cenerina *Lanius minor***

Specie migratrice e nidificante regolare, ma molto scarsa e localizzata, si elencano nuovi possibili o accertati siti di nidificazione.

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) dal 26 maggio al 3 luglio (G. Silveri [1]).

1 ind. presso le Grave di Maserada del Piave (TV) il 15 giugno (P. Vacilotto [1]).

1 cp. nidificante a Campagnamagra di Vigasio (VR), nuovo sito riproduttivo in provincia di Verona (A. Mosele, V. Dini, E. Cavallini [1]).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. a Ca' Roman (VE) il 14 aprile (L. Sattin *et al.* [1]).

Corvidae**Gracchio alpino *Pyrrhonorax graculus***

1 ind. a P.to Marghera (VE) il 16 giugno, in alimentazione presso una mensa aziendale (M. Semenzato).

Gracchio corallino *Pyrrhonorax pyrrhonorax*

1 ind. a San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR) tra il 23 e il 26 novembre (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Chiappisi [1][2]); si tratta della prima segnalazione nota per l'arco alpino orientale degli ultimi 50 anni.

Taccola *Corvus monedula*

Si segnala una concentrazione consistente.

122 indd. al *roost* dell'incile del Po di Tolle (RO) il 30 dicembre (D. Trombin).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

20 indd. a Salgareda (TV) il 10 febbraio (G. Sgorlon [1]).

51 indd. a Mansuè (TV) il 27 febbraio, si sono poi involati verso la provincia di Pordenone (G. Sgorlon [1]).

1 ind. a San Pelajo (TV) il 27 ottobre (U. Battistella [3]).

Sturnidae

Storno roseo *Pastor roseus*

10 indd. alle Ferrazze, Verona, il 25 maggio (C. Chiappisi, C. Izzo [1][2]).

1 ind. a Mestre (VE) il 27 maggio (E. Stival [1][3]).

Passeridae

Passera europea *Passer domesticus*

5-6 indd. in Val Fiorentina (BL) il 25 marzo (G. Salvato [1]), in un sito che si conferma abituale per la specie.

3 indd. a Faè di Oderzo (TV) il 16 ottobre (G. Sgorlon [1][3]).

Fringillidae

Venturone alpino *Serinus citrinella*

4 indd. ad Agordo (BL) il 2 novembre (F. Corvaja [1]).

Organetto *Carduelis flammea*

Si segnala un sito inusuale.

1 ind. alle sorgenti dello Storga (TV) il 27 novembre (L. Boscain).

Crociere *Loxia curvirostra*

Si elenca una osservazione in sito inusuale.

5-6 indd. a Porto Caleri (RO) il 19 ottobre (L. Boscain, P. Vacilotto); prima segnalazione in provincia di Rovigo.

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

1 ind. catturato e inanellato a Punta Vecia, Laguna di Venezia (VE) il 7 gennaio (N. Baccetti).

2-12 indd. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 28 gennaio e il 13 marzo (P. Parricelli, M. Azzolini, M. Sighele *et al.* [1][2]).

1-7 indd. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 7 dicembre e il 30 gennaio 2009 (M. D'offria, P. Parricelli, M. Sighele *et al.* [1][2]).

3 indd. sul Col Visentin (TV) il 23 dicembre (P. Vacilotto, L. Boscain, G. Della Pietà [1]).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

1-2 indd. a Maserada del Piave (TV) il 12 e il 13 gennaio (P. Vacilotto [1]).

2-4 indd. alle Grave di Ciano (TV) tra il 10 e il 18 febbraio (L. Boscain, P. Vacilotto, G. Silveri *et al.* [1]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 21 novembre (L. Boscain [1]); osservati in seguito 1-2 indd. fino al 12 marzo 2009 (G. Silveri [1]).

2 indd. a Maserada del Piave (TV) tra il 22 e il 30 dicembre (P. Vacilotto *et al.* [1][3][5]); le osservazioni, anche di 4-5 indd., sono proseguite fino all'11 marzo 2009.

Ortolano *Emberiza hortulana*

Si elenca una segnalazione al di fuori della pianura.

1-3 indd. a Velo Veronese (VR), 1.000 m slm, tra il 22 giugno e il 6 luglio (A. Petronio *et al.*, [2]).

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

1 ind. catturato al Busatello (VR) il 9 novembre marcato con anello di Praga e altro anello colorato di verde (M. Pesente, F. Novelli, P. Maragna [2]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. nuovamente osservato a Verona l'8 ottobre (L. Corradi).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

6 indd. in Valle Zignago (VE) sicuramente rilasciati (G. Tormen *et al.*).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 m. a Custozza (VR) per alcuni giorni a partire dal 12 agosto (E. Cavallini [2]).

Codone della Bahamas *Anas bahamensis*

1 ind. morfismo bianco presso le valli di Porto Viro (RO) il 4 ottobre (E. Verza).

Fistione beccorosa *Netta peposaca*

1 f. sul Lago di Busche (BL) dal 24 dicembre 2007 al 6 gennaio (M. Zenatello, P. Grotto, M. Cassol, M. Villa).

Fenicottero minore *Phoenicopterus minor*

1 ind. in Valle San Leonardo (RO) il 17 gennaio (D. Trombin, E. Di Gangi [1]).

1 ind. nelle Valli di Brenta (VE) il 24 marzo (P. Vacilotto [1]).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. presso Taglio di Po (RO) il 23 giugno (N. Donà).

Vescovo dorato *Euplectes afer*

1 ind. a Valle Moraro (RO) il 23 settembre (A. Favaretto, M. Piacentino).

APPENDICE.

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI
NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus*

1 ind. al Lago di Busche (BL) il 24 giugno 2007 (A. Doglioni, F. Scarton).

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

13 indd. sul Col Visentin (TV) il 26 dicembre 2006 e 3 indd. il 6 gennaio 2007 (G. Della Pietà).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e birdwatcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito di questo lavoro. Un particolare ringraziamento a Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Marco Pesente, Francesco Scarton e Massimo Semenzato per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899 – Note ornitologiche sulla Provincia di Verona. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 38 1/2: 75-191.
- BACCETTI N., PANZARIN L., CIANCHI F., PUGLISI L., BASSO M., ARCAMONE E., 2008 – Two new Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*) breeding sites in Italy. In: Childress B., Arengo F., Bechet A. (eds.). Flamingo, *Bulletin of the IUCN-SSC/Wetlands International Flamingo Specialist Group* 16: 24-27.
- BON M., SEMENZATO M. (a cura di), 2002 – Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 53: 231-258.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (a cura di), 2004 – Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 55: 171-200.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (a cura di), 2009 – Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 59: 129-151.
- CERATO E., 1990 – La Sterpazzolina, *Sylvia cantillans*, in provincia di Vicenza. *Riv. ital. Orn.*, 60 (3/4): 147-152.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009 – La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta* 33.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F., 2000 – Check-list degli Uccelli del Veneto (ottobre 2000). *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, Suppl. Vol. 1: 131-144.
- MASSA R. (a cura di), 2000 – I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.
- MEZZAVILLA F., STIVAL E., NARDO A., ROCCAFORTE P., 1999 – Rapporto Ornitologico Veneto Orientale, anni 1991-1998. *Centro Ornitologico Veneto Orientale*. Montebelluna (Treviso): pp. 60.
- VERZA E. & TROMBIN D., 2008 – Gli Aironi del Delta del Po. Monitoraggio degli Ardeidi del Delta del Po e della provincia di Rovigo. *Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po*: pp. 176.
- VIOLANI C. & BARBAGLI F., 2006 – Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes – Psittaciformes*. *Avocetta* 30 (num. sp.): 5-65.

Gli indirizzi internet di riferimento delle *mailing list* consultate sono:

EBN Italia: www.ebnitalia.it

Verona BW: www.veronabirdwatching.org

Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw

Menacò Brescia: www.menaco.org

BW-Italia: groups.yahoo.com/group/bw-italia